



Provokationen startas med en dos som bestäms med ledning av anamnes. Starta med lägsta dosen vid tveksamhet.

Doserna ges med 30 minuters intervall.

Blanda heläggspulver med vatten. Tillaga i mikron tills äggvröran har stelnat. Alternativt helt kokt mosat ägg.

Heläggspulver kan beställas från Källbergs Industri AB i Töreboda, telefon 0506-48500.

Dos	Mängd heläggspulver	Mängd kokt ägg	Kommentar
1	0,1 g heläggspulver blandas med 0,5 ml vatten	0,36 g kokt mosat ägg	Behöver endast ges vid stor risk för reaktion
2	0,2 g heläggspulver blandas med 1 ml vatten	0,72 g kokt mosat ägg	
3	0,5 g heläggspulver blandas med 2 ml vatten	1,8 g kokt mosat ägg	
4	1,0 g heläggspulver blandas med 4 ml vatten	3,6 g kokt mosat ägg	
5	2,5 g heläggspulver blandas med 8 ml vatten	9 g kokt mosat ägg	
6	5 g heläggspulver blandas med 16 ml vatten	18 g kokt mosat ägg	Motsvarar ca 1/3 ägg

Patienten stannar för observation 2 timmar efter sista provokationsdos.

Familjen uppmanas att ta kontakt för rapportering av ev. symptom som kommer efter hemgång.