



## B. Definitioner

### 3. Stadieindelning vid bedömning av astma/obstruktiv bronkit hos barn under 3 års ålder

Reviderad.  
2010

Giltighetstid: 3 år

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

Stadium	Aktivitet, AT	Andn frekv per minut	Indragning *	Blekhhet/ cyanos	Pip-/ väsljud	SaO2 (pulsoximetri)	Andningstyp, åtgärd mm
0	Normalt	20 - 30	0	0	0	Över 96 %	normalt
1	Normalt	25 - 30	0	0	(+)**		förlängd utandn vid ansträngn
2	Gör vilopauser	30 - 40	+	0	(+)**		förlängd utandning
3	Opåverkad i vila, orkar leka lite	40 - 50	+(+)	0	++	91-96 %	pressar, lätt uppblåst
4	påverkad i vila	>50	++	0	+++	86-90 %	pressar!, upp-blåst, indragt även interkostalt, ev blodgasanalys!
5	Påverkad! orolig, trött, orkar bara andas	>50	+++	+	+++	85 % eller lägre	kraftigt ansträngd andning, växlande andningsljud, blodgasanalys
6	Starkt påverkad, kallsvettig, orolig somnolent orkar knappast andas	Varierar		++			svagt andningsljud, kraftigt uppblåst, respiratorberedskap!

\* Halsgropen, subkostalt, interkostalt

\*\* I vila hörbart endast med stetoskop och kompression av torax, vid forcerad andning efter aktivitet hörbart även på avstånd

Om du nått detta dokument via en sökmotor bör du gå till [www.barnallergisektionen.se](http://www.barnallergisektionen.se) för att se det i sitt rätta sammanhang