



B. Definitioner

4. Stadieindelning vid bedömning av akut astma hos barn över 3 års ålder

Rev. 2010

Giltighetstid: 3 år

Barnallergisektionens stencilkommitté ansvarar för denna text. Vid frågor kontakta sektionens sekreterare.

PEF-mätning bör göras om patientens ålder och tillstånd tillåter det (stadium 1-3).
Ta även hänsyn till besvärens varaktighet!
Behandling enligt speciell stencil.

Stadium	Aktivitet	Position	Andningsbesvär*	Ronchi	SaO2 (pulsoximetri)	OBS!
1	Normal, tal u.a.	kan ligga	(+)-+	(+)**		PEF
2	Något nedsatt tal v.u.a.	Vill sitta	++	++(även distant)	Över 96 %	PEF
3	Orkar röra sig, talet påverkat	sitter	+++	+++ (även distant)	91-96 %	PEF/ev blodgasanalys
4	Orkar bara andas, talar enst. ord	Sitter framåtlutad	+++	+++ (även distant)	90 % eller lägre	blodgasanalys!
5	Ångestfylld, svårkontaktad, medvetandet grumlat		snabb ytlig andn. +			Blodgasanalys! respiratorberedskap

* Dyspné, tachypné, indragning och användande av auxiliär andning.

** I vila hörbart endast med stetoskop, vid forcerad andning hörbart även på avstånd.

Om du nått detta dokument via en sökmotor bör du gå till www.barnallergisektionen.se för att se det i sitt rätta sammanhang