

**Provokationsprotokoll**

Patient-ID \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Vikt: \_\_\_\_\_

Ämne \_\_\_\_\_ Startdos: \_\_\_\_\_

IgE- värde helextrakt (nivå &amp; datum): \_\_\_\_\_

IgE- värde komponenter (nivå &amp; datum): \_\_\_\_\_

Typ av provokation: Luftburen/Peroral

Öppen/Enkelblind/Dubbelblind del 1/Dubbelblind del 2/FPIES

Syfte med provokationen: Diagnos / Toleransutveckling

Tid	Mängd	Ämne (blandning)	Mängd allergen (g)	Signatur	Reaktion		Tid	Adm. tillfälle
					Nej	Ja		
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8

Ansvarig läkare: \_\_\_\_\_ Telefon/söknummer: \_\_\_\_\_

Symtom efter	Adm.tillfälle:	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Hud</b>									
Urtikaria - lokal - efter hudkontakt allergen									
- lokal - utan hudkontakt allergen									
- generaliserad*									
Hudrodnad – enstaka områden									
- mer utbrett men <50%									
- generaliserad (>50%)									
Hudklåda – kliar enstaka gånger									
– kliar sig kontinuerligt > 2 min									
–ihållande kraftig klåda som ger upphov till rivmärken									
– klåda lokaliserad handflator / fotsulor / skalp / genitalia									
Lindrig läppsvullnad									
Påtaglig läppsvullnad / ansiktssvullnad									
Uppblossande / förvärrat eksem									
<b>Orala-laryngeala</b>									
Klåda mun-svalg-läppar									
Pirringar mun-svalg-läppar									
Blåsor i mun-kindslemhinnan									
Klumpkänsla- trångetskänsla hals									
Harklingar									
Dreggling/ svårt att svälja (objektivt)									
<b>Magtarm</b>									
Illamående – lindrig (ej allmänpåverkad)									
Illamående – ihållande med allmänpåverkan									
Buksmärta – lindrig (ej allmänpåverkad)									
- uttalad med allmänpåverkan									
Kräkning - x1									
- x >1									
Diarre - x 1									
- x >1									
Inkontinens – avföring									
– urin									
<b>Annat:</b> .....									

Forts symtom efter	Adm.tillfälle:	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Respiratoriska</b>									
Stridor (inspiratorisk)									
Skällande hosta									
Icke skällande hosta									
Heshet									
Grötigt tal									
Dyspne (andnöd, trånghet i bröstet)									
Obstruktivitet** - lindriga besvär†									
- måttliga besvär†									
- svåra/mkt svåra besvär†									
Rosslig/slembiljud på lungorna									
Cyanos									
Hypoxemia (= sat < 94%)									
Andningsstopp									
<b>Ögon-näsa</b>									
Konjunktivit - efter allergenkontakt öga									
- utan allergenkontakt öga									
Rinit (snuva, nästäppa, nysningar)									
<b>Cirkulation</b>									
Takykardi† (ökning>15%)									
Hypotension †									
Bradykardi †									
Synkope									
Hjärtstopp									
<b>Neurologi</b>									
Subjektiv påverkan - Svaghetskänsla									
- Oro/katatrofkänsla									
- Yrsel									
Objektiv påverkan - Missnöjd, ledsen									
- Rastlöshet									
- Förvirrad									
- Trött									
- Somnolent									
- Medvetlös									

\* > 1 kroppsdel \*\* Obstruktivitet= ronki och/eller obstruktivt andningsmönster. † : För definition se lathund. †† : För normalvärden se lathund

**Konklusion:**

Provokationen bedöms vara:

positiv (om patienten får objektiva allergiska symtom)

negativ (om patienten inte får objektiva symtom)

Undvik i möjligaste mån inkonklusiv.

**Rekommendation angående:** Fortsatt elimination/Återintroduktion enligt protokoll

**Ordination vid behov:**

**Inj Adrenalin 1mg/ml**

... .. ml im Sign:.....

Givet kl: ..... Sign: .....

**Inh Ventoline**

via Maxin .....min Sign:.....

Givet kl: ..... Sign: .....

**Inh Ventoline**

Via Aiolos/Pari .....mg Sign:.....

Givet kl:..... Sign:.....

**T Acrius munlöslig**

2,5 mg /5mg ..... st po Sign:.....

Givet kl: ..... Sign: .....

**Acrius oral lösning 0,5mg/ml**

.....ml po Sign:.....

Givet kl:..... Sign:.....

**T Betapred**

0,5 mg ..... st po Sign:.....

Givet kl: ..... Sign: .....

**Inj Betapred 4 mg/ml**

.....ml i v Sign:.....

Givet kl: ..... Sign: .....

**Inf NaCl 9mg/ml/ Inf Ringer Acetat**

.....ml Sign:.....

Givet kl:..... Sign:.....